

6.	Making pain the fifth vital sign will increase current workload. <i>Perlaksanaan penilaian tahap kesakitan sebagai tanda vital ke-5 akan menambah beban kerja.</i>					
7.	Making pain the fifth vital sign will reduce the patient's length of stay in hospital. <i>Perlaksanaan penilaian tahap kesakitan sebagai tanda vital ke-5 akan dapat mengurangkan tempoh pesakit tinggal di hospital.</i>					
8.	Making pain the fifth vital sign will improve patient's satisfaction with the health service. <i>Perlaksanaan penilaian tahap kesakitan sebagai tanda vital ke-5 akan dapat meningkatkan tahap kepuasan pesakit terhadap perkhidmatan kesihatan.</i>					
9.	Analgesics should only be given to post-op patients when they complain of pain. <i>Bagi pesakit selepas pembedahan, ubat analgesik hanya perlu diberikan kepada pesakit yang mengadu sakit.</i>					
10.	A patient who keeps asking for analgesia must be addicted to the pain medication. <i>Pesakit yang kerap meminta ubat analgesik adalah seorang yang telah ketagih terhadap ubat tersebut.</i>					
11.	Patient should only be started on morphine when pain becomes unbearable. <i>Morphine hanya perlu dimulakan kepada pesakit yang mengalami kesakitan yang amat kuat.</i>					
12.	Have you attended course on P5VS or read the guideline? <i>Pernahkah anda menghadiri kursus Tahap Kesakitan Sebagai Tanda Vital-Kelima atau membaca garis panduan Pain as 5th Vital Sign?</i>	Yes Ya		No Tidak		

Thank you for your cooperation.